

¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

CUPERTINE M 41 WP

FUNGICIDA-INORGANICO, DITIOCARBAMATO

Metallic Copper (Copper Oxychloride, Copper Calcium Sulfate), MANCOZEB

CUIDADO

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION"
"MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION: Este producto es de acción protectante y actúa por contacto.

EQUIPO DE APLICACION: Este producto se aplica generalmente con bombas de mochila convencional. Es necesario verificar que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado de funcionamiento y libre de fugas. Previo a la aplicación es recomendable calibrar el equipo para garantizar una cobertura uniforme. Se recomienda utilizar boquillas de cono hueco.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: La mezcla de aplicación se prepara haciendo primero una pre-mezcla del producto y poco de agua. Llène el tanque de la aspersora con agua hasta la mitad y agregue la dosis correcta del producto, agítelo bien y complete el volumen de agua. La agitación debe de ser continua para mantener el material en suspensión. No se debe de dejar la mezcla para usar otro día. Si se usa una mezcla con otros productos, el orden de la mezcla es siempre CUPERTINE M 41 WP y luego el otro producto. Es importante disponer de dosificador para polvos, paletas de agitación y envases para la preparación de la mezcla. Terminada la aplicación lave bien el equipo, evitando la contaminación de fuentes de aguas, ríos, lagos o estanques. Mantenga su equipo de aplicación en buenas condiciones.



RECOMENDACIONES DE USO EN GUATEMALA:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS kg/ha
Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u> Chile <u>Capsicum annuum</u>	Tizón temprano <u>Alternaria solani</u> ; Mancha de la hoja <u>Stemphylium solani</u> ; Antracnosis <u>Colletotrichum capsici</u>	2-3
Aguacate <u>Persea americana</u>	Antracnosis <u>Colletotrichum sp.</u> ; Mancha de la hoja <u>Cercospora purpurea</u>	250 g/100 L de agua
Ajo <u>Allium sativum</u> Cebolla <u>Allium cepa</u>	Mancha púrpura <u>Alternaria porri</u>	2.5-3
Apio <u>Apium graveolens</u>	Secadera <u>Rhizoctonia sp.</u>	2-3
Cucurbitáceas <u>Cucumis spp.</u>	Alternaria <u>Alternaria cucumerina</u> ; Antracnosis <u>Colletotrichum langenarium</u>	2-3
Manzana <u>Malus sylvestris</u>	Sarna <u>Venturia inaequalis</u>	250-350 g/100L de agua
Mango <u>Mangifera indica</u>	Antracnosis <u>Colletotrichum langenarium</u> ; Cenicilla <u>Oldium mangifera</u>	250-350 g/100 L de agua
Zanahoria <u>Daucus carota</u>	Tizón de la hoja <u>Cercospora carotae</u>	2-3
Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Tizón temprano <u>Alternaria solani</u> ; Mancha de la hoja <u>Stemphylium solani</u>	2-4

INTERVALO DE APLICACION: 7 a 14 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Esperar como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de plaguicidas utilizados, excepto en caso de productos con marcada acción ácida o alcalina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Este producto es levemente inflamable y no es corrosivo, pero debe de ser almacenado en su envase original, bien cerrado y claramente etiquetado; no transporte junto con productos de consumo animal y humano. Almacénelo en bodegas seguras, alejado del fuego directo y la humedad. Manténgalo alejado de los niños, animales domésticos y alimentos.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA



SINTOMAS DE INTOXICACION: Irritación de las vías respiratorias y dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS:

Por ingestión: Solicitar atención medica inmediatamente muéstrela etiqueta.
Por inhalación: Trasladar al intoxicado a una zona ventilada inmediatamente. Solicitar atención medica.

Por contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua limpia durante 15 minutos como mínimo. En casos severos consulte a su médico.

Por contacto con la piel: Lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION

Guatemala CENTRO DE INFORMACION Y ASESORIA TOXICOLOGICA 1-801-00-29832

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y EL AMBIENTE:

Este producto es toxico para peces, crustáceos y abejas. No contamine lagos, ríos, o estanques con este producto. No aplique cuando las condiciones del tiempo favorezcan el desvío de la aspersión. Lave cuidadosamente el equipo de aplicación inmediatamente después de usarlo. El hecho de no ser persistente hace que no represente peligro para la fauna terrestre.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos y remanentes deben de eliminarse enterrándolos a 50 cm de profundidad, preocupándose por hacerlo alejado de viviendas y de no contaminar fuentes de agua.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: Garantizamos el contenido de este producto siempre que se encuentre en su empaque original bien cerrado con su sello de Garantía inalterado. No asumimos responsabilidades por posibles daños ocasionados por el mal uso de este producto. Sólo garantizamos el contenido declarado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El usuario adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.



Fabricante y Formulador:
Industrias Químicas del Valles, S.A.
Av. Rafael Casanova 81,
08100 Mollet de Vallés, Barcelona, España.
Telf.: 0034 93 579 66 77 - www.iqvagro.com



Importado por:
La Corneta, S.A.
5ª Avenida 0-40, Zona 13
Pamplona, Guatemala
PBX : (502) 2314-1100

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	586-8	12/03/2010